

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE (Tél. 47-22-87)

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 5, place Paul-Jamot - REIMS.  
C. C. P. : CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15

SUPPLÉMENT N° 2 AU BULLETIN N° 80 de MAI 1967

16 MAI 1967

## VIGNE

### INFORMATIONS

NLP 23-5-67 840751

#### Araignées rouges

Des éclosions ont été observées et un traitement avec un des produits conseillés dans la liste publiée en début d'année est indispensable dans les parcelles contaminées.

L'état actuel de la végétation permet l'utilisation des produits "systémiques".

#### Rougeot ou Brenner

En raison de la pousse rapide observée dans le vignoble, le traitement doit être renouvelé.

## ARBRES FRUITIERS

### AVERTISSEMENT

#### Tavelures pommier - poirier

Un traitement est indispensable sur toutes variétés avant le 20 mai. En raison du relèvement de la température, il doit être effectué même sous une légère pluie; dans ce cas, renouveler la protection dès la fin de la période pluvieuse.

### INFORMATIONS

#### Araignées rouges

Dans les vergers contaminés l'an dernier, un traitement spécifique contre cet acararien doit être réalisé dès maintenant; les éclosions étant généralisées dans tous les départements.

#### Anthracnose du cerisier

Un traitement est conseillé pour assurer la protection des arbres contre cette maladie.

INFORMATION

Meligèthes sur colza de printemps

Sur les colzas de printemps les plus avancés et cependant encore loin de la floraison, on remarque les premières concentrations de méligèthes.

Surveiller attentivement les colzas et intervenir dès la constatation des premiers dégâts.

En raison de leur cycle végétatif plus rapide que celui du colza d'hiver et donc de la moindre aptitude des plantes à remplacer les boutons détruits, il importe d'être très vigilant.

Le traitement peut parfois être limité aux bordures (sur 25 à 30 mètres) bien que les insectes aient tendance à se disperser davantage que sur les colzas d'hiver.

Les Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles.

l'Inspecteur de la Circonscription  
Phytopathologique de Champagne.